

LEPIEJ WIEDZIEĆ NA PEWNO

SCREENING DIAGNOSTYKA OTYŁOŚCI

Zakres screeningu

Zakres badań i ich kolejność może ulec zmianie zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta i rekomendacjami lekarskimi.


Pobyt jednodniowy – ok. 6 godzin

- etap 1** • **Wprowadzenie**
 - prezentacja planu screeningu i podpisanie zgód

 - etap 2** • **Testy laboratoryjne**
 - morfologia pełna – badanie krwi
 - badanie ogólne moczu, kreatynina – badanie nerek
 - sód, potas – poziom elektrolitów we krwi
 - kwas moczowy – diagnostyka dny moczanej i chorób nerek
 - ALT (GPT), AST (GOT), GGTP – badanie wątroby
 - amylaza – badanie trzustki
 - glukoza na czczo, hemoglobina glikowana – badanie pod kątem cukrzycy
 - insulina – badanie w kierunku insulinooporności
 - lipidogram – ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego
 - PT (INR, Quick) – badanie krzepliwości krwi
 - CRP – ilościowo – badanie pod kątem toczącego się stanu zapalnego
 - testy serologiczne: p.ciała przeciw HBs całkowite, HBs antygen, p.ciała przeciw HCV – zapalenie wątroby typu B lub C; p.ciała anti-HIV z antygenem p.24 – test COMBO – wykluczenie zakażenia HIV
 - witamina D-25(OH)D – niedobory witaminy D
 - adiponektyna – hormon wpływający na procesy metaboliczne
 - hormony: tyroksyna wolna – fT4, hormon tyreotropowy – TSH, prolaktyna – PRL, kortyzol
 - APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
 - Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne)
- EKG – kontrola nieprawidłowości pracy serca**
Pomiar masy ciała, wzrostu, talii

LEPIEJ WIEDZIEĆ NA PEWNO

SCREENING DIAGNOSTYKA OTYŁOŚCI

- 
- etap 3** • **Wstępna konsultacja lekarska**
wstępna ocena ryzyka:
- wywiad lekarski
 - badanie ogólne pacjenta
 - pytania i odpowiedzi
- etap 4** • **Badania na czczo**
- RTG klatki piersiowej
 - USG jamy brzusznej
 - USG Doppler żył kończyn dolnych
 - gastroscopia ze znieczuleniem tylnej ściany gardła oraz badanie na obecność *Helicobacter Pylorii*
- ŚNIADANIE**
- etap 5** • **Badania**
- echokardiografia – nieinwazyjna ocena pracy serca
 - spirometria*
 - poziom glukozy po posiłku (120 min) – ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy
 - poziom insuliny po posiłku
- etap 6** • **Konsultacja lekarza bariatry prowadzącego przy wypisie**
- interpretacja dostępnych wyników
 - odpowiedź na pytania pacjenta
- w innym terminie** • **Pozostałe konsultacje**
- konsultacja dietetyka
 - konsultacja psychologa

*Badanie jest wykonywane ze wskazań medycznych, o których decyduje lekarz prowadzący.